

100%
натуральний
продукт

для 100%
натурального
та смачного яйця



КАЛИНКА®

повнораціонний комбікорм

**ДЛЯ КУРЧАТ
КУРЕЙ НЕСУЧОК**

ЯКІСТЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕНА СВІТОВИМ ЛІДЕРОМ
У ГАЛУЗІ ГОДІВЛІ ТВАРИН

 **trouw
nutrition**

a Nutreco company

Сучасний
комбікормовий
завод
з голландськими
технологіями
та контролем
якості



не містить гормонів та штучних стимуляторів росту

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ГОТОВИХ КОМБІКОРМІВ

Вид комбікорму	Код продукту	Вік птиці, тижнів	Добова норма корму, г	Витрати корму за період, кг
Калинка стартер Н 1-8 тиж.	7019	1-8	15-50	1,8
Калинка молодняк Н 9-17 тиж.	7020	9-17	50-70	3,4
Калинка Н 17-32 тиж.	7021, 7023	18-32	70-110	10,4
Калинка Н 32+ тиж.	7022	від 32	110	

Перехід від одного виду комбікорму до іншого здійснюється протягом 3 днів. В цей період змішуйте 2 види комбікормів в пропорції 50/50.

СКЛАД: кукурудза, пшениця, шрот соняшниковий, висівки пшеничні, вапнякове борошно, сіль кухонна, амінокислоти, вітамінно-мінеральна суміш, кокцидіостатик*.

*Діюча речовина: стартер – саліноміцин.

ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ

Показник	Калинка Н1-8	Калинка Н8-17	Калинка Н17-32	Калинка Н 32+
Енергія, ккал/100г	297	297	305	270
Сира клітковина, %	3,9	5,7	4,2	4,6
Сирий жир, %	4,3	2,8	3,6	3,1
Кальцій, %	0,8	1	3,8	3,8
Фосфор, %	0,57	0,61	0,59	0,56

ТУ У 10.9-37017799-002:2020



РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТРИМАННЯ ЯЙЦЕНОСНИХ КУРЕЙ:

Сучасні кроси яйценосних курей можуть дати 350 яєць за рік.

Для досягнення найкращих результатів потрібно дотримуватися норм годівлі, санітарно-гігієнічних та мікрокліматичних умов утримання несучок.

Визначальними факторами успішного вирощування є наявність світла, води та корму впродовж 23-24 годин на добу у перші дні життя, а також дотримання правильного температурного режиму підстилки, кормушки, в приміщенні і під лампою (брудером).

ОСНОВНІ ПРАВИЛА УТРИМАННЯ МОЛОДНЯКА:

- біологічно безпечне та чисте середовище;
- обладнання не має заважати доступу птиці до корму та води;
- приміщення необхідно провітрити та прогріти до приїзду курчат. Підстилка та кормушки також повинні бути теплими;
- необхідно забезпечити курчат водою та кормом відразу після їх посадки;
- після посадки необхідно залишити курчат на 1-2 години для адаптації, після чого перевірити наявність води та корму.

ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ УТРИМАННЯ ПТИЦІ

Вік птиці, тижнів	t° в приміщенні, °C	t° під лампою (брудером), °C	Відносна вологість*
1	26	33	55-60
4-9	26	32	55-60
9-14	25	30	55-60
14-21	25	28	55-60
22-24	23-25		55-65
25-28	21-23		55-65
29-36	19-21		60-70
після 35	17-19		60-70

* Низька вологість в перший тиждень вирощування призводить до зниження імунітету, затримки росту курчат та неоднорідності поголів'я.



5 / 10 / 25 КГ

СВІТЛОВИЙ РЕЖИМ

Вік, днів	1	5	7	10	14	17	22 і до кінця
Вага птиці, г	65	350	550	850	1130	1270	
Світловий день, годин хв.	22-23	12	10	10	10	10	14-16

Якщо птиця в 17 тижнів досягла ваги 1300г, то світловий день слід продовжити на 1 годину. Потім кожного тижня збільшувати по 30 хвилин до досягнення 15-16 годин. Скорочення світлового режиму під час несучості призводить до зниження продуктивності.

Починаючи з 16 тижня рекомендовано змішувати комбікорм «Калинка Н 8-17» з «Калинка Н 17-32» в пропорції 50/50 до віку 17,5 тижнів - для накопичення кальцію і забезпеченню доброї якості шкарлупи у майбутньому.

Подовження світлового дня та високий вміст кальцію в кормі («Калинка Н 17-32») стимулює птицю до несучості.



Для отримання детальної інформації про наші продукти завітайте на наш сайт:
www.kalinkakorm.com.ua

ТОВ «Трау Нутришин Україна»

Тел. +38 (044) 536-93-93

kalynka.support@trouwnutrition.com

08131, Київська область, Бучанський район,
с. Софіївська Борщагівка, пров. Чорновола, 3.

