

100%
натуральний
продукт



для 100%
натурального
та смачного м'яса

КАЛИНКА®

комбікорми


ДЛЯ КРОЛІВ

ЯКІСТЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕНА СВІТОВИМ ЛІДЕРОМ
У ГАЛУЗІ ГОДІВЛІ ТВАРИН

 **trouw
nutrition**

a Nutreco company

Сучасний комбікормовий
завод з голландськими
технологіями та контролем
якості



не містить гормонів та штучних стимуляторів росту

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ГОТОВИХ КОМБІКОРМІВ

№1 (додатково додавати сіно)

Вид комбікорму	Код продукту	Вік кролів, днів	Добова норма корму, г	Витрати кормів за період, кг
Калинка К 20-60 стартер	6804, 6809	20-60	45-65	1,8-2,0
Калинка К 60-110 гровер	6805, 6810	61-110	100-140	6,5-7,0
Калинка К лакто	6803		85-170	3,5-4,0

№2

Вид комбікорму	Код продукту	Вік кролів, днів	Добова норма корму, г	Витрати кормів за період, кг
Калинка К 20-60 стартер	6804, 6809	20-60	60-90	2,2-2,5
Калинка К 60-110 гровер	6805, 6810	61-110	120-180	7,8-8,5
Калинка К лакто	6803		120-170	4,0-5,0

СКЛАД: пшениця, кукурудза, соняшниковий шрот, вапнякове борошно, трав'яне борошно, висівки пшеничні, вітамінно-мінеральна суміш, сіль кухонна, амінокислоти, кокцидіостатик*.

*Діюча речовина: стартер, гровер, кролематки – диклазурил.

КОМБІКОРМИ

для кролів

ТУ У 10.9-37017799-006:2020



КОРОТКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТРИМАННЯ КРОЛІВ

При інтенсивному способі вирощування кролі у віці 3,5 місяців досягають живої ваги 2,5 кг, а у 110 днів – більше 4 кг без використання антибіотиків та штучних стимуляторів росту.

Найефективніший метод вирощування – на повноцінних гранульованих комбікормах. Гранули мають суттєву перевагу над насипним комбікормом та сінним борошном, тому що дрібні частки корму та пил негативно впливають на дихальну систему кролів. Структура гранули допомагає уникнути такого негативного ефекту, одночасно забезпечуючи кролів усіма необхідними поживними речовинами для гарного росту та продуктивності. При ефективному вирощуванні та повноцінних комбікормах можна отримати конверсію корму (витрати корму на 1 кг приросту) на рівні 3 кг. Економічно найвигідніше тримати кролів до 4 місяців. Після цього споживання корму росте, а прирости зменшуються.



5 / 10 / 25 КГ

ДОБОВЕ СПОЖИВАННЯ ПІДСИСНИМИ КРОЛЕНЯТАМИ МОЛОКА ТА ГРАНУЛЬОВАНОГО КОРМУ

Відлучати кроленят найоптимальніше у віці 31-45 днів. Перші пару днів після відлучки доцільно дати комбікорм з великим вмістом клітковини. Далі клітковина має складати не менше 11% раціону.

Вік, тиж.	Молоко, г	Комбікорм, г	Жива вага, г
4	16,1	12,5	380
5	19	31	610
6	13	43	790
7	9	85	950

Вода дуже важлива для кролів, особливо влітку. Кролі мають потові залози тільки на лапках, тому вони охолоджуються, облизуючи шерсть. Кролі повинні споживати води в 2 рази більше ніж корму.

Кролі мають декілька особливостей: копрофагія — поїдання нічного (м'якого) калу. Це важливий процес, особливо для молодняка. Таким чином вони збільшують кількість корисної мікрофлори, отримують додаткові мікроелементи, вітаміни і дуже цінний мікробний протеїн.

Інша особливість — дуже швидкий ріст різців. Якщо крізь не буде отримувати достатньо грубих кормів (клітковини), різці не будуть зточуватися і загнуться. Це призведе до втрати кроля.

Повноцінний корм запобігає канібалізму — поїдання плаценти та кроленят — головною причиною якого найчастіше є неповноцінна годівля, страх, знаходження самця поблизу, недостатня кількість води, важкий окріл (через ожиріння). Поїдання кролями волосу один у одного пов'язують з неповноцінною годівлею і дефіцитом клітковини.

Кролі віком	Комбікорм + сіно	
	комбікорм, г	сіно, г
до 60 днів	45-65	30-45
60-110 днів	100-140	50-80
кролематка сукрільна, 4 кг живої ваги, перші 3 тижні сукрільності	145-170	45-80
останній тиждень сукрільності	85-110	25-50

Важливо, щоб раціон сукрільних маток містив 12% клітковини. При цьому корм дозволяється давати в необмеженій кількості, адже клітковина запобігатиме ожирінню та більше норми вони не з'їдять.

ВАЖЛИВО: за 1-2 дні до забою перестати годувати кролів кормом з вмістом кокцидіостатику.

Переваги комбікормів «Калинка К»:

- рання відлучка кроленят – вік – 30-40 днів;
- висока інтенсивність росту – 35-45 г середній добовий приріст, 4 кг у віці 110-115 днів;
- можливість отримати 6-7 окролів (при інтенсивності 9);
- підвищення імунітету кролів;
- якісне хутро;
- підвищення економічних показників виробництва.



Для отримання детальної інформації про наші продукти завітайте на наш сайт: www.kalinkakorm.com.ua

ТОВ «Трау Нутришин Україна»

Тел. +38 (044) 536-93-93

kalynka.support@trouwnutrition.com

08131, Київська область, Бучанський район,
с. Софіївська Борщагівка, пров. Чорновола, 3.

