



ЕФЕКТИВНЕ СВИНАРСТВО



ЗМІСТ

Ефективне вирощування поросят.....	2
Мілківін йогурт.....	4
Престартер Престо 5-24.....	6
Престартери 5-40+.....	7
Продукти для поросят стартерного періоду (10-30 кг).....	10
ПРОДУКТИ ДЛЯ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ (30-110 кг).....	11
ПРОДУКТИ ДЛЯ ГОДІВЛІ СВИНОМАТОК та КНУРІВ.....	12
СЕЛАЦИД ГГ	16
СЕЛКО-ЦІД-СП.....	17
AlpHa.....	18
ТОКС-О XL.....	19
ФІЛАКС.....	20
Контроль якості.....	22
Технічні рекомендації.....	23
Рекомендації щодо управління фермою:	
Супоросний період.....	26
Опорос.....	27
Вирівнювання гнізд.....	28
Додаткова годівля поросят.....	30
Годівля відлучених поросят.....	31



a Nutreco company

Компанія Трау Нутришин – визнаний світовий лідер з виробництва кормів та кормових добавок для тварин, потужний центр інновацій та наукових досліджень у сфері годівлі.

- Надійний бізнес-партнер у складі корпорації Нутреко, SHV Holdings N.V. (Нідерланди).
- Представництва у 105 країнах світу.
- Науково-дослідницькі центри.
- Сертифікована якість та безпека кормів.
- Потужна українська команда.
- Власне виробництво преміксів та концентратів в Україні.
- Технічний супровід господарств та індивідуальний підхід.

МІСІЯ

Основне завдання нашої галузі – нагодувати майбутні покоління. Адже для того, щоб забезпечити харчові потреби світового населення у 2050 році, необхідно на 70% збільшити виробництво продуктів харчування в цілому і білка зокрема.

Завдяки нашому досвіду та постійному вдосконаленню ми створюємо інновації та запроваджуємо революційні зміни, що допоможуть вирішити основне завдання нашої галузі.

Трау Нутришин протягом десятиліть працює над перетворенням науки в дієві та практичні рішення для годівлі тварин і управління фермами.

ФОКУС ІННОВАЦІЙ ТРАУ НУТРИШИН:

1. Точне фермерство.
2. Здорове життя.
3. Збалансована годівля молодняка.
4. Безпека та якість кормів.
5. Сталий розвиток.

Розробка і впровадження наших інновацій проходить тривалий шлях від розробки до випробування і вдосконалення на базі науково-дослідницьких центрів та у співпраці з провідними фахівцями світу за напрямками: годівля тварин, метаболізм, фізіологія, імунологія, молекулярна біологія, біохімія, кормові технології, мікробіологія, ветеринарія.

ЕФЕКТИВНЕ ВИРОЩУВАННЯ ПОРОСЯТ

Перший період життя тварин – найважливіший, адже він насичений стресовими ситуаціями: народження, відлучення від свиноматки та перехід від годівлі молоком на стартовий комбікорм. З перших днів життя поросят ми допомагаємо забезпечити їм усі умови для росту. Компанія Трау Нутришин розробила програми годівлі LifeStart («ЛайфСтарт»), що передбачають здорове та продуктивне середовище для вирощування за допомогою позитивного впливу на здоров'я, поживності та правил утримання впродовж 6-ти періодів раннього життя поросят – від народження до відлучки.

Трау Нутришин пропонує оптимальне рішення для поросят на початку життя за допомогою трьох різних програм годівлі Milkiwean, які можна адаптувати до умов утримання, породних особливостей та системи керування на вашій фермі:

КЛЮЧ ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ГОДІВЛЕЮ

✓ VITAL START

Для зміцнення імунітету



Високі смакові якості



Максимальна збереженість поголів'я



Високоякісний білок та клітковина



Ранній розвиток та здоров'я кишечника

⚖ EFFICIENT START

Орієнтація на рентабельність



Найкраща продуктивність при низькій собівартості



Енергетично-амінокислотний баланс



Максимальна продуктивність



Високоякісний білок з різних джерел



Необхідний рівень лактози

b BEST START

Спрямований на ефективність



Найкращий старт життя



Максимальне споживання



Ранній розвиток імунітету



Висока концентрація поживних речовин



Легкозасвоюваний білок

MILKIWEAN VITAL START

Програма Milkiwean Vital Start була розроблена для потреб свинокомплексів, на яких виникають проблеми зі здоров'ям тварин. Мета програми: оптимальна підтримка розвитку поросят під час складного процесу відлучення. Більш здоровий початок життя поросят дає змогу отримати більш сильних та життєздатних тварин, а також забезпечити стаке виробництво зі зниженою залежністю від антимікробних засобів; при цьому здоров'я тварин і прибутковість ферми залишаються на тому ж або вищому рівні.

MILKIWEAN EFFICIENT START

Призначена для виробників, поросята яких мають оптимальний стан здоров'я, і які віддають перевагу ефективності на рівні окремих тварин, фермерського господарства та галузі загалом. Milkiwean Efficient Start підтримує формування здоров'я поросят із максимальною продуктивністю та мінімальними втратами, тому ви зможете отримати вищу рентабельність інвестицій та продовжувати розвивати свій бізнес.



Feeding the Future



Основні переваги Milkiwean Efficient Start:

- Підвищення ефективності корму до 6 %.
- Зниження собівартості кілограма приросту до 10 %.
- Технологія, яка може реагувати на коливання на ринку інгредієнтів.
- Простий у використанні портфель продуктів.


MILKIWEAN BEST START

Розроблена для виробників свиней, які прагнуть досягти максимальної продуктивності та вищих показників виробництва фермерського господарства.

Основні переваги Milkiwean Best Start:

- Краще зростання і вища спроможність споживання корму.
- Вища вихідна вага та поліпшена однорідність.
- Високий рівень засвоюваності поживних речовин.

СХЕМИ ГОДІВЛІ



МІЛКІВІН ЙОГУРТ (для поросят 0-14 днів)


Переваги:

- додаткова енергія;
- кращий розвиток поросят;
- більша вага поросят на відлучку;
- більша кількість відлучених поросят на свиноматку;
- високий відсоток збереженості поросят та їх однорідності;
- легкий перехід до грубих кормів;
- відсутність потреби в штучній свиноматці;
- кращі результати на відгодівлі.

До складу Йогурту входять інгредієнти високої якості:

- молочні продукти;
- жирні кислоти;
- імуноглобулін;
- легко засвоювані вуглеводи;
- ароматизатор і комплекс органічних кислот, які забезпечують високі смакові якості.

Високоякісна годівля у перший період життя додає 2-3 кг забійної ваги



Джерело: дослідницька ферма Innsolrig, Бельгія

ПОЖИВНІСТЬ (на 1 кг продукту)

Сирий протеїн	min	%	20,00
Сирий жир	min	%	20,00
Сира клітковина	max	%	0,00
Лактоза	min	%	32,50
Зола		%	5,70
Лізин	min	%	1,70
Метіонін	min	%	0,55
Мет + Цис	min	%	0,97
Треонін	min	%	1,00
Триптофан	min	%	0,26
Вітамін А	ME		40 000
Вітамін D3	ME		5 000
Вітамін Е	ME		300
Вітамін С	ME		170
Залізо (Fe)	мг		95
Мідь (Cu)	мг		170
Цинк (Zn)	мг		90
Кальцій (Ca)	%		0,35
Фосфор (P)	%		0,45
Натрій (Na)	%		0,38
Обмінна енергія	Ккал/кг		4 500



Feeding the Future

ВИКОРИСТАННЯ МІЛКІВІН ЙОГУРТ

ДОЗУВАННЯ 300 Г/Л:

- Розчинити йогурт в теплій воді (+45°C) у співвідношенні 1:3.
- Поросята повинні САМІ очистити годівницю: якщо вони не виїли корм, приберіть його.
- Перед наступним годуванням зменшіть кількість йогурту.
- Годуйте перші 4 дні, використовуючи мірну чашку, **НЕ ДАВАЙТЕ надто багато!**

КОРИСНІ ПОРАДИ ЩОДО ГОДУВАННЯ

- Споживання може варіюватися, тому відрегулюйте частоту даванок і кількість йогурту, щоб перед наступною годівлею поросята повністю виїли вміст тарілки.
- Бажано спорожнити миску під час наступного годування.
- Потрібне регулярне та ретельне очищення тарілки та обладнання.

«Мілківін Йогурт» (300 г + 1 л води, t° води: + 45°C)

День 1	День 2	День 3	День 4	День 5	Дні 6-12
молозиво свиноматки (перші 24 години)	1 х/д 50 мл	2 х/д 50 мл	2 х/д 100 мл	2 х/д 150 мл	2 х/д 250 мл
-	50 мл	100 мл	200 мл	300 мл	500 мл
-	-	-	-	-	додатковий корм (Престо) (кашка або сухий)

1

Використовуйте
3-літрову посудину
з теплою водою (45°C)



2

Відміряйте
1 кілограм
Мілківін Йогурт
та додайте води



3

Суміш добре розмішати,
переконавшись, що
продукт повністю
розчинено



4

Влийте суміш
у чисту миску
для поросят



ПРЕСТАРТЕР ПРЕСТО 5-24

- Престартер, який стимулює раннє споживання комбікорму та сприяє розвитку травного тракту у новонароджених поросят;
- легкозасвоюваний гранульований корм діаметром 2 мм (крупка), що стимулює імунітет;
- додатковий корм при багатоплідності і недостатній кількості молока у свиноматки

Краща продуктивність:

- більша маса при відлученні від свиноматки;
- кращий щоденний приріст ваги після відлучення від свиноматки.

1

Стимулює процес травлення, завдяки вмісту органічних кислот, мінералів, термічно оброблених злаків та високому вмісту лактози.

2

Протеїн сировинних компонентів, що використовуються для виготовлення «Престо», має найкращі показники засвоєння маленькими поросятами (немає антипоживних факторів).

3

Показує найкращі та стабільні результати.

4

«ПРЕСТАРТЕР ПРЕСТО» рекомендується використовувати для поросят починаючи з віку 2-4 днів.

При переході на інший корм або інший престартер рекомендується змішувати «Престартер Престо» у співвідношенні 50:50 протягом 2-3 днів.

ПОЖИВНІСТЬ (на 1 кг продукту)

Сирий протеїн	min	г	195
Сира клітковина	min	г	29
Сирий Жир	min	г	48
Лактоза	min	г	140
Чиста енергія	min	Ккал	2.520
Лізин	min	г	14,5
Метіонін	min	г	5,4
Мет + Цис	min	г	8,8
Треонін	min	г	9,3
Триптофан	min	г	3,0
Валін	min	г	10,1
Кальцій (Ca)	min	г	7
Фосфор (P)	min	г	4,8
P перетравний	min	г	4
Натрій (Na)	min	г	2,5
Мідь (Cu)	min	мг	150
Залізо (Fe)	min	мг	115
Йод (I)	min	мг	1,5
Селен (Se)	min	мг	0,42
Цинк (Zn)	min	мг	2500
Біотин	min	мг	275
Фолієва кислота	min	мг	1
Ніацин	min	мг	30
Вітамін B5	min	мг	13,8
Вітамін B1	min	мг	2
Вітамін B2	min	мг	6
Вітамін B12	min	мг	30
Вітамін B6	min	мг	2
Вітамін A	min	МО	15003
Вітамін D3	min	МО	2000
Вітамін E	min	МО	100
Бетаїн	min	мг	300





ХАРАКТЕРИСТИКА

- Престартерний комбікорм для безпечного відлучення поросят;
- поживний, забезпечує стабільний приріст поросят;
- мінімальний кормовий стрес у період відлучення.


ВИКОРИСТАННЯ ПРЕСТАРТЕРІВ 5-40+

- Відлучення можливе з 21-28 днів, середня вага відлучених поросят: 8-9 кг.
- Як повноцінний комбікорм Престартер 5-40+ або до 10 днів після відлучення для плавного переходу (за умови використання «Престартера Престо» до 24 днів).
- Від 3 до 6 кг на одне порося, після чого можливий перехід на стартерний комбікорм.

ПЕРЕВАГИ

- 1 Краща продуктивність: більший щоденний приріст ваги під час відлучення.
- 2 Містить органічні кислоти, які поліпшують травний процес, швидко знижуючи рівень pH в шлунку та діють антибактеріально на патогенну мікрофлору в кишечнику.
- 3 Забезпечує стабільно високі результати.
- 4 Містить збалансовану комбінацію молочних та рослинних протеїнів.
- 5 Має високу енергетичну цінність.


Престартер Presto



ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ ПРЕСТАРТЕРІВ ТРАУ НУТРИШИН

(* вміст на 1 кг продукту)

Код продукту	Одиниця виміру	8001_11	8101_994	8002
Назва		Престартер 5-40 днів	Комбікорм 100% Поросята, престарт 5-40 днів	МКВ Престарт 5-40 кінетіо ЄС
Сирий протеїн	г	193,0	182,0	179,0
Сира клітковина	г	28,0	33,0	24,8
Сирий Жир	г	52,0	60,0	41,5
Чиста енергія	Ккал	2.500	2.500	2.450
Лізин	г	14,3	13,4	14,017
МЕТ	г	4,5	5,9	5,083
МЕТ+Цис	г	8,0	9,0	8,611
Треонін	г	9,0	10,1	9,29
Триптофан	г	3,1	3,0	2,903
Валін	г	9,5	9,6	9,533
Пер. Лізин	г	13,2	12,4	12,8
Пер. МЕТ	г	4,2	5,6	4,7
Пер. МЕТ+Цис	г	7,1	8,2	7,7
Пер. Треонін	г	7,9	9,1	8,215
Пер. Триптофан	г	2,7	2,7	2,567
Пер. Валін	г	8,3	8,5	8,346
Кальцій (Ca)	г	6,5	5,3	6,2
Р перетравний	г	4,6	4,2	4,2
Натрій (Na)	г	3,0	2,8	2,5
Мідь (Cu)	мг	150,3	158,7	141,2
Залізо (Fe)	мг	109,5	143,4	174,0
Йод (I)	мг	1,6	1,6	1,5
Селен (Se)	мг	0,4	0,4	0,42
Цинк (Zn)	мг	1.986	2.487	2.234
Біотин	мкг	100,0	104,7	100,0
Ніацин	мг	30,0	31,4	30,006
Вітамін B5	мг	13,8	14,4	13,8
Вітамін А	МО	15003,0	15700,0	15003,0
Вітамін B1	мг	2,0	2,1	2,0
Вітамін B12	мкг	30,0	31,4	30,0
Вітамін B2	мг	6,0	6,3	6,0
Вітамін B6	мг	2,0	2,1	2,0
Вітамін D3	МО	2.000	2.093	2.000
Вітамін E	МО	100,0	104,7	100,0



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕСТАРТЕРІВ ТРАУ НУТРИШИН

OUR PURPOSE

Feeding the Future



1

СМАКОВІ ЯКОСТІ

Створено для підтримки постійного споживання корму протягом всього періоду життя.



2

ВОДА

Контроль якості для забезпечення оптимального розвитку.



3

БЕЗПЕКА КОРМІВ

Розроблено для забезпечення надійного захисту.



4

КЛІТКОВИНА

Розроблено для підсилення розвитку ШКТ та мікробіоти.



5

ДЖЕРЕЛА ПРОТЕЇНУ

Ретельно відібрані для досягнення оптимальної засвоюваності.



6

АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД

Спеціально розроблений для забезпечення нормального функціонування імунної системи.



7

СПЕЦІАЛЬНІ ІНГРЕДІЄНТИ

Для підтримки кишкової мікробіоти і здоров'я.

ПРОДУКТИ ДЛЯ СТАРТЕРНОГО ПЕРІОДУ ПОРОСЯТ (10-30 кг)

БІЛКОВІ ТА ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ ВІД 10 ДО 30 КГ:

«Хендрікс 10-30 Екстра» 25%

«КТ 10-30» 25%

«Хендрікс 10-30» 5%

«Макскер Порося Екс» 3%

«Польфамікс Порося Екс» 3%.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ДОБАВОК ДЛЯ ПОРОСЯТ:

- Високоякісні складові добавок дозволяють робити ранній перехід із престартерного комбікорму на стартер.
- Ферментний комплекс забезпечує максимальне перетравлення та засвоєння комбікорму.
- Збалансований склад у вітамінах, макро-, мікроелементах та незамінних амінокислотах.
- Зручні у застосуванні.
- Стабільно високі прирости та однорідність поголів'я.

РЕКОМЕНДОВАНІ РАЦІОНИ ДЛЯ ПОРОСЯТ

Сировина		раціон №1	раціон №2	раціон №3	раціон №4
Ячмінь	%	20	18	20	20
Кукурудза	%	25	27	25	24
Пшениця	%	30	30	25	28
Соева макуха 39%СП	%	-	-	25	25
«КТ10-30» 25%	%	25	-	-	-
«Хендрікс 10-30 Екстра» 25%	%	-	25	-	-
«Хендрікс 10-30» 5%	%	-	-	5	-
«Макскер Порося Екс» 3%	%	-	-	-	3



ПРОДУКТИ ДЛЯ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ (30-110 кг)

OUR PURPOSE

Feeding the Future

Для максимального використання генетичного потенціалу, фізіологічних особливостей свиней та зменшення затрат період відгодівлі розділений на два періоди:

1 ПЕРІОД ВІДГОДІВЛІ (30-70 кг живої ваги).

Лімітуючий фактор цього періоду – розмір шлунку свині. Тому рекомендується використовувати концентрований, необ’ємний, оптимально збалансований комбікорм, що забезпечить максимальні прирости.

2 ПЕРІОД ВІДГОДІВЛІ (від 65-70 кг живої ваги і до забою).

Характеризується використанням дешевих, але збалансованих комбікормів.

БІЛКОВІ ТА ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ ДЛЯ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ:

- «КТ 30-60» (15%)
- «Хендрікс 30-60 Екстра» (20%)
- «КТ 60-110» (10%)
- «Хендрікс 60-110 Стандарт» (12,5%)
- «КТ 30-110» (5%)
- «Макскер Відгодівля Екс» (2,5%)
- «Польфамікс Відгодівля Екс» 2,5%.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ДОБАВОК:

- Приготування збалансованих повноцінних комбікормів безпосередньо на господарстві.
- Високий рівень вітамінів та мікроелементів покращує метаболічні процеси і сприяє швидкому росту свиней.
- Безпечна протеїнова сировина високої якості: соєвий шрот 45%СП, соєва макуха 40% СП, соняшниковий шрот 38% СП.
- Фітазний фермент дозволяє зменшити рівень мінерального фосфору в комбікормі, покращує засвоєння інших звільнених компонентів корму.
- Ферментний комплекс забезпечує максимальне перетравлення та засвоєння комбікорму.

РЕКОМЕНДОВАНІ РАЦІОНИ ДЛЯ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ

Сировина		від 30 до 70 кг					від 70 кг до забою				
		рац. №1	рац. №2	рац. №3	рац. №4	рац. №5	рац. №1	рац. №2	рац. №3	рац. №4	рац. №5
Ячмінь	%	22	22	28	18	20	30	24	40	30	30,5
Кукурудза	%	24	22	24	26	24	20	25	15	18	20
Пшениця	%	34	33	33	27	30	30	25	35	25	25
Соєва макуха 40%СП	%	-	-	-	17	18,5	-	-	-	10	10
Соняшниковий шрот 38%СП	%	-	8	-	7	5	-	8	-	8	8
Вівітки пшеничні	%	-	-	-	-	-	7,5	8	-	4	4
«КТ 30-60» 15%	%	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-
«Хендрікс 30-60 Екстра» 20%	%	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«КТ 60-110» 10%	%	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-
«Хендрікс 60-110 Стандарт» 12,5%	%	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-
«КТ 30-110» 5%	%	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-
«Макскер Відгодівля Екс» 2,5%	%	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	2,5

ПРОДУКТИ ДЛЯ ГОДІВЛІ СВИНОМАТОК ТА КНУРІВ

ЛАКТУЮЧІ СВИНОМАТКИ

- «КТ 20 Лакто» 20%
- «Хендрікс Лакто Стандарт» 22,5%
- «Хендрікс Лакто Бетаїн» 22,5%
- «Хендрікс Лакто» 5%
- «Макскер Свиноматка Екс» 2,5%
- «Макскер Свиноматка Лакто Екс» 2,5%
- «Польфамікс Свиноматка Екс» 2,5%.

ПОРОСНІ СВИНОМАТКИ

- «КТ 10 Прегна» 10%
- «Хендрікс Прегна Стандарт» 12,5%
- «Хендрікс Прегна» 5%
- «Макскер Свиноматка Екс» 2%
- «Макскер Свиноматка Прегна Екс» 2%
- «Польфамікс Свиноматка Екс» 2%.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ:

- Високий рівень вмісту вітамінів А, Е, біотину задовольняє потребу в них у поросних свиноматок та сприяє розвитку їх ембріонів
- Легкозасвоювані фосфор, кальцій і натрій покривають збільшені потреби лактуючих свиноматок.
- Збалансовані екзогенні амінокислоти (лізин, метіонін, треонін) підтримують високу молочність і хорошу кондицію свиноматок.
- Магній знижує рівень стресу у лактуючих свиноматок в період лактації.

КОНЦЕПЦІЯ ГОДІВЛІ «МОРЕ МОЛОКА»

полягає у застосуванні продуктів для супоросу та лактації, які збільшують кількість молозива та молока, покращують однорідність, збереження народжених та відлучених поросят.

При зниженні температури навколишнього середовища потреба тварин в комбікормах збільшується. При підвищенні температури спостерігається погіршення поїдання комбікорму.

Концентрат «Хендрікс Лакто Бетаїн» зменшує вплив теплового стресу на свиноматок у період високої температури середовища, в якому утримується свиноматка.

КОМБІКОРМ ДЛЯ КНУРІВ ПОЄДНУЄ:

збалансований вміст вітамінів А, D, Е та біотину, забезпечуючи високу якість сперми та здорову рогівку ратиць;

оптимальний вміст клітковини та амінокислот, підтримуватиме кнурів в оптимальній кондиції при годівлі 2,5-2,8 кг на голову/добу;

збалансоване співвідношення Ca, P та інших мінералів.



ПРОГРАМА ГОДІВЛІ СВИНОМАТОК

OUR PURPOSE

Feeding the Future



Дослідження Трау Нутришин та статистика показують, що високий рівень корму в цей період підтримує вироблення молозива на початку лактації.

Збільшений об'єм корму у поєднанні з високими рівнями перетравної клітковини запобігають закрепам.

Однак, в деяких випадках, стрес навколо родильного процесу у поєднанні з надмірною годівлею може стати причиною переїдання, запалення вимені та неоднорідності поросят.

УПРАВЛІННЯ СТАДОМ

Перед осіменінням, свинки та свиноматки повинні бути в хорошому стані. Вага свиноматки, товщина шпиків і кондиція впливають на її продуктивність. Стимулювання свинок і свиноматок перед осіменінням (згодовування мінімум 3 кг лактаційного або стимулюючого корму на день) покращує їх репродуктивну функцію. Після осіменіння індивідуальна годівля свинок і свиноматок переважно визначається їх кондицією.

Протягом першого місяця поросності свиноматка потребує значний рівень корму для розвитку плаценти і виживання ембріонів. Протягом другого і третього місяців супоросу кількість корму може бути трохи зменшена. В останні 14 днів супоросу значна кількість корму забезпечує вагу і розмір новонароджених поросят, плавність родового процесу та молоковіддачу.

РАЦІОНИ СВИНОМАТОК

1


РАЦІОН ДЛЯ ПОРОСНИХ СВИНОМАТОК

використовується для свиноматок відразу після осіменіння, протягом усього періоду поросності до переведення свиноматки в родильний зал

2

РАЦІОН ДЛЯ ЛАКТУЮЧИХ СВИНОМАТОК

використовується за 3-5 днів до опоросу і до моменту наступного осіменіння свиноматки після відлучення.



РЕКОМЕНДОВАНІ РАЦІОНИ												
		СУПОРΟΣ					ЛАКТАЦІЯ					
		раціон №1	раціон №2	раціон №3	раціон №4	раціон №5	раціон №1	раціон №2	раціон №3	раціон №4	раціон №5	раціон №6
Ячмінь	%	30	29,5	25	28,7	34	20	33,5	25	25	27	30
Кукурудза	%	17	20	15	18	15	21	18	19	20	16	15
Пшениця	%	25	20	27	20	20	30	25	30	23	25	24
Соева макуха 40% СП	%	-	-	3	4	2,7	-	-	-	16	17	16
Соняшниковий шрот 38% СП	%	-	-	9	8	10	-	-	-	6	5	6
Висівки пшеничні	%	18	18	16	18	15	5	-	5	4	5	5
Соева олія	%	-	-	-	0,5	0,5	1,5	1	1	1	1,5	-
«Крейда»	%	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	1	1,5
«КТ 10 Прегна» 10%	%	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Хендрікс Прегна Стандарт» 12,5%	%	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Хендрікс Прегна» 5%	%	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
«КТ 20 Лакто» 20%	%	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
«Хендрікс Лакто Стандарт» 22,5%	%	-	-	-	-	-	22,5	-	-	-	-	-
«Хендрікс Лакто Бетаїн» 22,5%	%	-	-	-	-	-	-	22,5	-	-	-	-
«Хендрікс Лакто» 5%	%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
«Макскер Свиноматка Екс» 2,5%	%	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2,5	-
«Макскер Свиноматка Лакто Екс» 2,5%	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
«Макскер Свиноматка Прегна Екс» 2%	%	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

Feeding *the Future*

для ремонтного молодняку							для кнурів					
		раціон №1	раціон №2	раціон №3	раціон №4	раціон №5	раціон №1	раціон №2	раціон №3	раціон №4	раціон №5	раціон №6
Ячмінь	%	28	25	24	30	30	26	16,5	30	23	27	23
Кукурудза	%	17	25	20	18	15	18	20	22	25	20	25
Пшениця	%	25	22	22	23,2	28	30	35	23	24	25,5	25
Соева макуха 40% СП	%	8	8	9	10	7	-	-	-	9	11	12
Соняшниковий шрот 38% СП	%	2	10	8	6	9	-	-	-	9	7	6
Вісівки пшеничні	%	10	5	12	10	8	5	5	5	4	5	5
Соева олія	%	-	-	-	-	0,5	1	1	-	1	1	-
«Крейда»	%	-	-	-	0,8	0,5	-	-	-	-	1	1,5
«КТ 10 Прегна» 10%	%	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Хендрікс Ремонт» 5%	%	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Хендрікс Прегна» 5%	%	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
«КТ 20 Лакто» 20%	%	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
«Хендрікс Лакто Стандарт» 22,5%	%	-	-	-	-	-	-	22,5	-	-	-	-
«Хендрікс БМВД для кнурів» 20%	%	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
«Хендрікс Лакто» 5%	%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
«Макскер Свиноматка Екс» 2,5%	%	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2,5	-
«Макскер Свиноматка Лакто Екс» 2,5%	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
«Макскер Свиноматка Прегна Екс» 2%	%	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

СЕЛАЦИД ГГ ПРИРОДНИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТУ

Селацид ГГ – синергетична суміш органічних і коротко- та середньоланцюгових жирних кислот, з високою ефективністю проти грам-позитивних бактерій шлунково-кишкового тракту (Стрептокок, Клострідій) та грам-негативних бактерій (Кишкова паличка, Сальмонела).

Дієва і натуральна альтернатива протимікробним стимуляторам росту, що даються у корм.

Покращує здоров'я кишківника та продуктивність свиней.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ТВАРИН:

- Розвиток та здоров'я ШКТ;
- покращення перетравлення кормових інгредієнтів;
- мінімізація проблем із діареєю.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ:

- Підвищення продуктивності тварин:
 - краще споживання корму;
 - вищі прирости;
 - нижча конверсія корму.
- Зменшення використання медичних препаратів.
- Економічна ефективність (збільшення прибутків).

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

- стимуляція мікрофлори кишківника (заселення лактобактеріями) замість руйнівного впливу антибіотиків;
- зниження рівню рН;
- зменшення буферної ємності кормів у шлунку тварини.

РЕКОМЕНДОВАНЕ ДОЗУВАННЯ

	Стандарт, кг/т	Преміум, кг/т
Поросята < 12 кг	2	3
Поросята 12-30 кг	4	6
Відгодівля 30-70 кг	3	4
Відгодівля від 70 кг	1	1
Свиноматки в період лактації	3	5
Свиноматки супоросні	2	3



Selacid
Health promoter feed

СКЛАД:

- Е 200 Сорбінова кислота
- Е 330 Лимонна кислота
- Е 236 Мурашина кислота
- Е 270 Молочна кислота
- Е 280 Пропіонова кислота
- Е 551 а Кремнієва кислота
- Е 295 Форміат амонію
- Е 260 Оцтова кислота
- Захищені жирні кислоти

ДОСТУПНЕ ФАСУВАННЯ:
25 кг

* У випадку проблем зі здоров'ям тварин, рекомендовано збільшити дозу на 50%

СЕЛКО-ЦІД-СП: СУХИЙ ПІДКИСЛЮВАЧ ДЛЯ КОМБІКОРМУ

OUR PURPOSE

Feeding the Future



СКЛАД:

- Е 236 Мурашина кислота
- Е 260 Оцтова кислота
- Е 270 Молочна кислота
- Е 280 Пропіонова кислота
- Е 295 Форміат амонію
- Е 551 а Кремнієва кислота

ДОСТУПНЕ ФАСУВАННЯ:
25 кг

СЕЛКО-ЦІД-СП – синергетична суміш вільних та буферних органічних кислот.

Високоєфективний препарат проти грам-негативних (Кишкова паличка, Сальмонела) бактерій шлунково-кишкового тракту. Завдяки своєму складу та широкому спектру дії Селко-ЦІД-СП знижує вплив інфекцій на організм, а також потребу у використанні антибіотиків. Загалом препарат покращує здоров'я кишківника та продуктивність свиней. Дієва і натуральна альтернатива, що була створена на протипагу протимікробним стимуляторам росту, які додаються в корм.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ТВАРИН:

- Покращення здоров'я кишківника;
- покращення перетравлення кормових інгредієнтів;
- мінімізація проблем із діареєю.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ:

- Підвищення продуктивності тварин:
 - покращення споживання води;
 - вищі прирости.
- Нижча конверсія корму
- Зменшення потреби використання антибіотиків.
- Економічна ефективність (збільшення прибутків).

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

- Широкий спектр дії проти патогенних бактерій (грам-негативних) з корму до шлунково-кишкового тракту;
- стимуляція мікрофлори кишківника (заселення лактобактеріями) замість руйнівного впливу антибіотиків;
- зниження рівню рН;
- зменшення буферної ємності кормів у шлунку тварини.

РЕКОМЕНДОВАНЕ ДОЗУВАННЯ

Рекомендовані дози	Стандарт, кг/т	Преміум, кг/т
Поросята < 12 кг	7	10
Поросята 12-30 кг	5	8
Гровер 30-70 кг	4	6
Фінішер 70-110 кг	3	4
Свиноматки в період лактації	5	8

AlpHa: РІДКИЙ ПІДКИСЛЮВАЧ ДЛЯ ВОДИ

AlpHa – синергетична суміш вільних та буферних органічних кислот.


Вільні кислоти, що використовуються в AlpHa є надзвичайно ефективними проти грам-негативних бактерій (Кишкова паличка, Сальмонела) в кишківнику тварин та питній воді, проте їх дія не закінчується в шлунку тварини чи птиці. Буферизовані кислоти забезпечують проходження органічної кислоти через шлунок в кишечник, де вони проявляють антибактеріальну дію. AlpHa є ефективною комбінацією вільних та буферизованих органічних кислот, що вирізняє його на ринку продуктів органічних кислот.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ТВАРИН:

- вживання безпечної та здорової питної води;
- зменшення біоплівки в системі водопостачання;
- поліпшення здоров'я кишківника;
- покращення перетравлення кормових інгредієнтів;
- зменшення діареї.

РЕКОМЕНДОВАНЕ ДОЗУВАННЯ

1.0 - 2.0 л AlpHa на 1000 л питної води (рН 3.6 - 4.3)



ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ:

- Підвищення продуктивності тварин:
 - покращення споживання води;
 - вищі прирости.
- Нижча конверсія корму.
- Зменшення використання антибіотиків.
- Економічна ефективність (збільшення прибутків).

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

- широкий спектр дії проти патогенних (грам-негативних) бактерій, що потрапляють в кишківник із питною водою;
- зниження рівню рН та зменшення буферної ємності корму у шлунку тварин.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОДУКТУ:

	Selko-pH	AlpHa
Мікроелементи	Cu (3750)	Cu (2200) Zn (600)
Суміш органічних кислот	Мурашина кислота Оцтова кислота	Мурашина кислота Оцтова кислота Пропіонова кислота
Буфер	Форміат Амонію	Форміат Натрію



СКЛАД:

- Е4 Мідь
- Е6 Цинк
- Е236 Мурашина кислота
- Е 280 Пропіонова кислота
- Е 295 Форміат амонію
- Бензойна кислота Е260
- Оцтова кислота

МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ РН, ЗА ЯКОГО МОЖЛИВИЙ ПРИРІСТ НАСТУПНИХ БАКТЕРІЙ:

- Ешерихія коли: 4,4 рН
- Сальмонела: 4,5 рН
- Стрептокок: 4,4 рН
- Кампилобактерія: 4,8 рН
- Клострідія: 4,7 рН

ДОСТУПНЕ ФАСУВАННЯ:

25 кг
1000 кг

ТОКС-О XL: АДСОРБЕНТ ТОКСИНІВ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ

OUR PURPOSE

Feeding the Future



TOXO®

СКЛАД:

- смектитові глини для зв'язування мікотоксинів
- стінки дріжджових клітин та бета-глюкани для стимулювання імунної системи
- біополімери глюкози для захисту кишківника

ДОСТУПНЕ ФАСУВАННЯ:
25 кг

ТОКС-О XL – це комплексне рішення проти широкого спектру токсинів, які продукують гриби.

ТОКС-О є частиною комплексного підходу для підтримки свиней. Призначений для всіх статевих вікових груп свиней, містить кілька механізмів для підтримання здоров'я тварини в боротьбі з мікотоксинами. ТОКС-О XL є ефективним проти афлотоксину (AFLA), вомітоксину (DON), зеараленону (ZEA), охратоксину (OTA), фумонізіну (FUM), та має у своєму складі спеціальні інгредієнти, які підтримують цілісність стінок кишківника та стимулюють імунну систему.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ:

Смектитові глини для ефективнішого зв'язування мікотоксинів, в порівнянні з бентонітами.

РЕКОМЕНДОВАНЕ ДОЗУВАННЯ

ТОКС-О XL можна застосовувати у випадках профілактики або лікування мікотоксикозів у свиней, а також додаватися до преміксів та концентратів.

1

Низький рівень зараження:
1,0-1,5 кг на 1 т корму

2

Високий рівень зараження:
2,0-2,5 кг на 1 т корму



ФІЛАКС: ІНГІБІТОР ПЛІСНЯВИ ТА ГРИБКІВ



ФІЛАКС ФОРТЕ-НС — синергічна суміш органічних кислот і поверхнево-активних речовин.

Виготовляється за технологією виробництва активованих пропіонатів. Продукт призначений для обробки зерна кукурудзи, пшениці, ячменю, жита та гороху за натуральною вологістю до 22%. З Філакс Форте-НС зберігання зернової сировини є можливим без його додаткового сушіння.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ:

- можливість зберігання у складських приміщеннях, рукавах та силосах до 1 року при натуральній вологості, але не вище за 22%;
- контроль плісневих грибів та збереження поживної цінності зерна;
- попередження міграції вологи в зерні після обробки продуктом.



 **Selko**
Fylax®

СКЛАД:

- 1,2 – пропандіол;
- E200 сорбінова кислота;
- E236 мурашина кислота;
- E260 оцтова кислота;
- E270 молочна кислота;
- E 280 пропіонова кислота;
- E284 амонію пропіонат;
- E484 гліцерил поліетиленгліколь рицинолеат;
- чисті дистильовані жирних кислот.

ДОСТУПНЕ ФАСУВАННЯ:
1000 кг



Feeding the Future

КОНТРОЛЬ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ:

- Уникайте «ефекту димоходу» при зберіганні у силосі чи приміщенні.
- Проводьте температурний контроль. Оброблене належним чином зерно не повинне нагріватися вище за 30°C, а після 6 тижнів температура повинна бути <25°C.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Оброблене препаратом Філакс Форте-НС зерно може використовуватися лише для годівлі тварин.

За додатковою інформацією просимо звертатися до регіонального представника Трау Нутришин Україна.



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ. ДОЗУВАННЯ

Доза Філакс Форте-НС залежить від вологості сировини, що оброблятиметься, та очікуваного терміну зберігання. Доза препарату визначається за найвищим значенням вологості в партії зерна.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

- проведіть очистку зерна перед обробкою;
- проведіть, за необхідності, фумігацію зерна;
- переконайтеся, що препарат наноситься на зерно рівномірно;
- постійно перевіряйте температуру зерна після завершення обробки;
- для зберігання зерна на складі його слід засипати однорідним пластом.

ОБРОБКА СИРОВИНИ:

цільна кукурудза / пшениця / ячмінь / жито / горох
з використанням рідини Філакс Форте-НС (кг/тону)

рівень вологості, %	Термін придатності (місяців)		
	від 1 до 3	від 4 до 6	від 7 до 12
≤ 13	0,7	0,8	1,2
14-15	0,8	1,2	3
15-16	1	1,5	4
16-18	2	2,5	5
18-20	3	4	6
20-22	3,7	5	7
≥ 22	не рекомендується		

ЗБІЛЬШІТЬ ДОЗУ ПРЕПАРАТУ НА 10%, ЯКЩО:

- аерація в приміщенні для зберігання зерна є недостатньою;
- присутнє зелене насіння інших рослин, котре може бути джерелом нагрівання;
- зерно зберігається в досить вологих та теплих кліматичних умовах ($\geq 25^{\circ}\text{C}$);
- відносна вологість повітря $\epsilon > 80\%$.

Трау Нутришин Україна входить до корпорації Нутреко, SHV Holdings N.V. (Нідерланди), що представлена у 105 країнах світу. Дослідження та постійне вдосконалення нашої продукції спирається на науково-дослідницькі та лабораторні центри, потужну базу даних та багаторічні напрацювання провідних світових фахівців з тваринництва.

На виробничих потужностях Трау Нутришин здійснюється постійний ретельний контроль якості вхідної сировини та готової продукції.

На заводі Трау Нутришин Україна у Вінницькій області працює власна лабораторія, що оперативно здійснює аналізи сировини і готової продукції на обладнанні Foss, Bestmix, AgroCares та інших провідних виробників лабораторного обладнання.

Центральна лабораторія корпорації – Masterlab, знаходиться у Нідерландах і має спільну базу даних з українським виробництвом, що забезпечує швидкий і доступний контроль якості. Система об'єднує усі лабораторії операційних компаній Нутреко та створює спільне середовище для інформаційного забезпечення з метою надання стандартизовано-якісних послуг (результати аналізів, методи та ін).

За допомогою ручного сканера NOA консультанти Трау Нутришин Україна протягом декількох хвилин отримують інформацію про ключові показники поживності сировини на господарствах. Оперативний контроль якості економить час і кошти наших клієнтів, забезпечуючи захист здоров'я тварин та стабільну ефективність господарств.



ТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТРАУ НУТРИШИН УКРАЇНА

OUR PURPOSE

Feeding the Future

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗМІРУ ЧАСТИНОК У СКЛАДІ КОРМІВ ДЛЯ СВИНЕЙ

Розмір частинок, (мм)	Поросята, 10-30 кг	Свині, 30-100 кг	Свиноматки, хряки, реммолодняк
< 1	60%	55%	50%
1-2	35%	35%	28%
2-3	5%	7%	15%
> 3		3%	7%

Правильний розмір частинок в кормі забезпечує оптимальне змішування та бажану конверсію, а також сприяє здоров'ю та розвитку ШКТ.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКУ ЗМІШУВАННЯ:

1	ЗЕРНОВІ
2	МІНЕРАЛИ
3	СУХІ СИРОВИННІ КОМПОНЕНТИ
4	ЖИРИ / ОЛІЯ

МАКСИМАЛЬНІ ДОПУСТИМІ РІВНІ ВМІСТУ МІКОТОКСИНІВ

Сировина	Афлатоксин		Зеараленон		Фумонізін		Вомітоксин		Охратоксин		T2	
	EU	UA	EU	UA	EU	UA	EU	UA	EU	UA	EU	UA
зернові (крім кукурудзи)	0.02	0.02	2	1			8	1	0.25	0.05	0.5	
кукурудза	0.02	0.02	2	1	60		8	1	0.25	0.05	0.5	0.1
відходи кукурудзи	0.02	0.02	3	1	60		12	1		0.05	0.5	
соевий шрот	0.02	0.025		1				1		0.05		0.1
соева макуха	0.02	0.025		н/д.				1		0.05		0.1
Вид тварин	Afla		Zea		Fum		DON		Охратоксин		T2	
	EU	UA	EU	UA	EU	UA	EU	UA	EU	UA	EU	UA
свині		0.02	0.25	0.25/ 2.0- 3.0 ***		5		0.5/1	0.05	0.05	0.25	0.1
поросята, свиноматки, племінні кнурі	0.01	0.005	0.1	н/д.	5	5	0.9	0.5/1	0.01-0.05	0.01	0.25	0.1

* тварини старше 4х місячного віку

** тварини старше 2х місячного віку

*** свині на відгодівлі масою до 50 кг не більше 2.0 мг/кг, більше 50 кг до 3.0 мг/кг

ВИМОГИ СПОЖИВАННЯ ВОДИ ДЛЯ СВИНЕЙ

	Споживання води (л)
Рем. свинки	8-10
Супоросні свиноматки	10-12
Лактуючі свиноматки	20-40
Відлучені поросята	1-3.7
Гроверний період	3-6
Фінішний період	3-6
Кнурі	16

ОПТИМАЛЬНА ВИСОТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОЇЛОК

Ніпельні поїлки	
Свиноматки, поросята і свині на відгодівлі	На 10 см вище спини тварини
Поросята-сисуні	При куті 90° висота повинна становити близько 10-15 см; при куті 45° – близько 15-30 см. Краще всього, коли висота поїлки регулюється у відповідності з ростом поросят.
Поїлки у вигляді корита/чаші	
Поросята-сисуні	6 см
Поросята на дорощуванні	10-15 см (1 поїлка на 10 гол.)
Поросята на відгодівлі	20-30 см (1 поїлка на 12 гол.)
Свиноматки	40-50 см

ДОВЖИНА ГОДІВНИЦЬ

Маса свині (кг)	Довжина годівниці при дозованій годівлі (м)
5	0.12
25	0.2
30	0.2
50	0.27
100	0.3-0.33

ВИМОГИ ЩОДО ВЕНТИЛЯЦІЇ/ПОВІТРООБМІНУ

	Мін. швидкість руху повітря м³/год	Макс. швидкість руху повітря м³/год
Свиноматки після відлучення поросят	20	120-150
Свиноматки, друга половина вагітності	20-25	120-150
Свиноматки з поросятами	20-26	160-200
Поросята після відлучки	2-3	10-20
Поросята 10 кг	3-4	12-15
Поросята 15 кг	4-6	15-18
Поросята 20 кг	5-7	18-20
Поросята 25 кг	6-9	20-25
Початок періоду відгодівлі	6-8	30-40
Свині 30 кг	8-10	35-45
Свині 50 кг	10-12	45-55
Свині 100 кг	14-20	60-80

ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ

Газ	Макс. концентрація (на м³ повітря) згідно до рекомендації	Макс. концентрація (на м³ повітря) згідно вимог
Амоніак	10 ppm	до 20 ppm
Вуглекислий газ	до 500 ppm	до 3000 ppm
Сірководень	до 5 ppm	5 ppm

Feeding the Future

МІНІМАЛЬНІ ТА ОПТИМАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ПЛОЩІ ПІДЛОГИ ТА ОБ'ЄМУ, З РОЗРАХУНКУ НА ГОЛОВУ

Жива вага	Поверхня станка/бокса*		
кг	Мінімальні європейські вимоги (м)	Оптимальні європейські вимоги (м)	Стандарти об'єму (м)
<10	0.15	0.15	1
<20	0.2	0.2	1
<30	0.3	0.4	1
<50	0.4	0.6	2,5-3
<85	0.55	0.8	2,5-3
<110	0.65	1	2,5-3
>110	1	1	2,5-3
Рем. свинки	1,64	1,64	3
Холості свиноматки	2,25	2,25	10
Свиноматки на осіменінні	2,8	2,8	10
Супоросні свиноматки	2	2	10
Свиноматки з поросятами	4,5	4,5	12-15
Зона гнізда поросят	0,6	0,6	-
Кнурі	6	6	12-15
Кнурі плідники	10	10	15-20

* У випадку надмірного зростання температури, площа підлоги повинна бути збільшена настільки, щоб тварини, коли вони лежать, не торкались один одного


РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ У ПРИМІЩЕННІ ДЛЯ СВИНЕЙ РІЗНИХ СТАТЕВО-ВІКОВИХ ГРУП

	Температура в приміщенні °C
Рем. свинки після відлучення поросят	20-22
Свиноматки після відлучення поросят	20-22
Перша половина вагітності	20-22
Друга половина вагітності	18-20
Свиноматки до опоросу	18-20
Лактуючі свиноматки без-посередньо після опоросу	20-22
Новонароджені поросята	30-32
Лактуючі свиноматки, 2 дні після опоросу	18-20
Поросята, 2 дні від народження	28-30
Поросята після відлучення	28-30 (2°C вище при використанні щілевої підлоги)
Поросята 10 кг	24-28
Поросята 15 кг	23-26
Поросята 20 кг	21-24
Поросята 25 кг	20-22
Початок періоду відгодівлі	22-24
Свині 30 кг	20-22
Свині 50 кг	20-22
Свині 100 кг	20-22

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ФЕРМОЮ

ПРОТОКОЛ СУПОРОСНОГО ПЕРІОДУ

Успішний супорос починається з родильного відділення



Слід звернути увагу під час лактації:


- більше 10% втрати маси тіла після опоросу;
- поступове збільшення добової даванки має позитивний ефект на показники заплідненості




5 дів після запліднення ембріони розподіляються по рогах матки



Закріплення ембріонів та формування плаценти триває близько 20 дів після запліднення




Контроль денної спожитої енергії




Поради щодо годівлі супоросних свиноматок

- Високі рівні легкозасвоюваної клітковини для доброго розвитку ембріонів та плаценти.
- Підтримання належних кондицій тіла свиноматок для доброго розвитку поросят.
- Більше протеїну для кращого росту поросят




Уникайте суперництва за їжу




Групове утримання

Змагання за їжу може призвести до кульгавості, проблем з ратицями та смертності




Вирішуйте проблему змагання за їжу через наявність перегородок між кормо-місцями




УСПІШНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОДНОРІДНОСТІ
ГНІЗД ПОРОСЯТ




Відповідні кондиції тіла свиноматки для забезпечення нормального опоросу



Перевірка консистенції калових мас. Якщо наявні сильні запори слід згодовувати перехідний корм








ПРОТОКОЛ ОПОРОСУ

1 Увімкніть лампу обігріву 	2 Забезпечте свиноматку додатковою водою 	3 Перевірте кімнатну температуру 
4 Контролюйте температуру у гнізді поросят 	5 Занотуйте час народження першого поросяти 	6 Занотуйте загальну кількість народжених поросят протягом 5 год. Нормальний час між народженням двох поросят повинен бути 20-30 хв. 

ПЛАЦЕНТА

повинна з'явитись
протягом 30 хв.



ПЛАЦЕНТА повинна з'явитись протягом 30 хв.		1 Відмітьте загальну кількість народжених поросят ТАК 	
1 Не вводьте ін'єкційний окситоцин свиноматці на початку опору HI 	2 Немає поросят протягом 15 хв. 	3 Очистіть вульву 	4 Використовуйте рукавиці та гель-лубрикант 
5 Не вводьте руку занадто глибоко 	6 За наявності кровотечі з пупка – накласти лігатуру 	7 Введіть свиноматці ін'єкцію окситоцину 	8 Занотуйте виконані дії 

ПРОТОКОЛ ВИРІВНЮВАННЯ ГНІЗД


1

Молозиво до 24 год.
після народження



2

Не більше поросят, ніж функціональ-
них сосків




3

Правильний час для формування
гнізд

4

Занотувати початок процедури




5

Висадити більших поросят і сформу-
вати однорідне гніздо




6

Позначити скільки поросят було до-
дано і забрано




РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМНОЇ СВИНОМАТКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ ТА ГНІЗДА



ДОДАТКОВА ГОДІВЛЯ ПОРОСЯТ


Забезпечте поросят рідку підгодівлю через 24 год після опоросу



Результатом є краще споживання сухої речовини, краща перетравність та ранній розвиток кишківника




Стимулюйте споживання корму поросятами, розміщуючи їх годівнички поряд з годівницею свиноматки



Свиноматка є найкращим вчителем для поросят




Подавайте престартер в годівничку або на підлогу




Задавайте престартер у місце відпочинку поросят




ГОДІВНИЦІ У РОДИЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ




Годівниця має бути чиста та порожня перед годівлею



Коли корм засипають у порожню годівницю, це більше привертає увагу поросят і заохочує їх.



Корм втрачає смак та запах, якщо він надто довго знаходиться у годівницях




За наявності несприятливих умов, поросятм дають розчин електролітів, додатково до молока свиноматок



ГОДІВЛЯ ВІДЛУЧЕНИХ ПОРОСЯТ

Процес відлучення є стресовим процесом



Розпочніть з такого ж самого корму і таким самим способом, як і у родильному відділенні



Активний спосіб життя стимулює на споживання корму поросятами



Підсипайте кілька разів на день корм у відкриті годівниці



Поросята потребують приблизно 1 літр води на 10 кг маси тіла




Подовжуйте світловий день для стимуляції споживання корму



КОНТРОЛЬ КЛІМАТУ



Оцінюйте температуру через спостереження за поросятами



Поросята мають почуватися комфортно у зоні відпочинку



Комфортна поведінка

Превірте температуру та вологість



Некомфортна поведінка

Завжди перевіряйте налаштування клімату і/або запитуйте поради у експерта





ТОВ «Трау Нутришин Україна»

08131, Київська область, Бучанський район,
с. Софіївська Борщагівка,
пр. Чорновола, 3.
Тел.: +38 (050) 536-93-93
www.trouwnutrition.ua